

Informations en vue d'un traitement
- PERFUSION IV DE KÉTAMINE/LIDOCAINE/MAGNÉSIUM -

ACCOMPAGNATEUR

Le patient doit absolument être accompagné d'un parent ou d'un ami responsable après la perfusion, afin de l'accompagner à son domicile, que ce soit en voiture, en transport en commun ou autre. Le patient ayant reçu ce traitement ne peut pas conduire pendant 24 heures après la perfusion, en raison des effets de la kétamine et/ou du sédatif. Il serait idéal que le patient s'assure de ne pas rester seul pour le reste de la journée.

MÉDICAMENTS ET PROCÉDURE

Tous les médicaments nécessaires au traitement seront fournis sur place. Un reçu sera émis afin d'obtenir le remboursement par les assurances du patient, dans un 2^e temps. Dans certains cas, un très léger sédatif et/ou un anti-nauséeux peut être suggéré afin d'optimiser le confort et minimiser les effets secondaires au patient

Une voie intraveineuse sera installée. Avant la perfusion, des instructions supplémentaires seront données et on demandera au patient de déterminer son état de base. Pendant la perfusion, nous surveillerons leurs signes vitaux et gérerons les effets secondaires, s'il y en a. La dose à perfuser est calculée en fonction du poids du patient. La perfusion dure 45 minutes, mais avec le temps de récupération, la visite dure environ 1h à 1h30. Les perfusions peuvent être effectuées dans une pièce où peuvent se trouver d'autres patients. En raison des règles de confidentialité, les patients ne sont pas autorisés à prendre des appels, des photos ou des vidéos. Il lui sera demandé de mettre vos appareils en mode avion.

Si un patient prend de la kétamine en sirop à la maison, il est important de ne PAS prendre la dose du coucher ni toute dose avant le traitement. Le patient doit prendre TOUS les autres médicaments régulièrement prescrits le jour du traitement, sauf si indication contraire. Il ne faut pas arrêter les anticoagulants sauf si le patient est également programmé pour une autre procédure le nécessitant. Si le patient suit un programme de réduction des opioïdes, il doit prendre 25% de moins de sa dose habituelle le matin pour éviter des effets secondaires excessifs pendant ou après la perfusion.

Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, soyez sans crainte, le médecin spécialiste sera disponible afin d'y répondre avant de procéder à votre traitement.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Les appareils électroniques sont autorisés à des fins de divertissement uniquement. En raison des règles de confidentialité des patients, les patients ne sont pas autorisés à prendre des appels, des photos ou des vidéos pendant les perfusions. Il vous sera demandé de mettre vos appareils en mode silencieux.

AUTRES INSTRUCTIONS SUGGÉRÉS

- Ne pas manger un repas lourd 2-4 heures avant le traitement
- Porter des vêtements amples et confortables (pas de jeans serrés ni de ceinture)
- Ne pas porter de vernis à ongles (cela peut causer de l'interférence avec nos moniteurs)
- Porter des chaussures confortables, bout fermé / dos fermé (ne portez pas de tongs / sandales)
- Vouloir informer l'équipe médicale si allaitement ou suspicion de grossesse

SUIVI

Si le patiente souhaite parler au médecin spécialiste de toute autre chose que la perfusion, SVP réserver un autre rendez-vous de suivi afin d'éviter de retarder l'horaire des traitements et d'échanger des informations personnelles dans la salle de traitement. Un suivi médical téléphonique sera fait 3 semaines après le traitement.

***** APORTEZ DE LA MUSIQUE / DES CASQUES OU DES BOUCHONS D'OREILLES POUR VOUS DÉTENDRE ET ÉVITEZ DE PARLER FORT, POUR NE PAS DERANGER LES AUTRES PATIENTS *****

Douleur Médic

Une équipe qui fait la différence!

Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, soyez sans crainte, le médecin spécialiste sera disponible afin d'y répondre avant de procéder à votre traitement.